

20^e GENRE. *EBURNA*. Lamarck, 1801. Latrunculus. Gray, 1847.

Coquille ovale ou allongée, lisse, profondément ombiliquée; l'ombilic bordé à gauche par un bourrelet; à spire aiguë, à sutures plus ou moins canaliculées, à tours convexes. Columelle arquée, calleuse postérieurement. Ouverture ovale-allongée. Bord droit simple, aigu.

Animal à tête allongée et aplatie, garnie de tentacules longs, effilés. Yeux saillants à la base externe des tentacules. Pied ovale, arrondi en avant, plus étroit en arrière, et garni d'un opercule ovale-allongé, à nucléus apical. Ex. : *E. areolata*, Lamarck; *E. spirata*, Linné; *E. valentiana*, Swainson; *E. lutosa*, Lamarck.

Sous-genre. *ZEMIRA*, H. et A. Adams, 1853. — Coquille à ombilic médiocre. Bord droit dentelé à la partie antérieure. Ex. : *E. australis*, Sowerby.




Fig. 784.
E. spirata.

Fig. 785.
E. areolata.

Fig. 786.
E. valentiana.

Fig. 787.
E. lutosa.

Fig. 788.
E. australis.

5^e FAMILLE. CYCLOPSIDÉS. *CYCLOPSIDÆ*.

Nous croyons devoir former une famille pour quelques espèces classées jusqu'ici avec les nasses ou immédiatement après elles. Le mode d'enroulement de ces coquilles, et leur forme irrégulière, les éloignent assez des types qui précèdent pour justifier cette mesure, quels que soient d'ailleurs les rapprochements que puissent présenter les animaux. Cette famille comprend les genres cyclops et teinostoma.

21^e GENRE. *CYCLOPS*. Montfort, 1810. Neritula. Plancus, 1739.
Cyclonassa. Agassiz, 1847. Nana. Schumacher, 1817.

Coquille néritiniforme, orbiculaire, convexe-déprimée, oblique. Spire aplatie, à sommet quelquefois indiqué par une légère saillie ou épine. Columelle lisse. Un calus étalé sur toute la face inférieure du dernier tour. Ouverture subquadrangulaire. Canal large et court. Bord droit réfléchi, lisse. Ex. : *C. neriteus*, Linné; *C. Kamiesch*, Nobis. Nous avons trouvé cette petite espèce parmi des crevettes vivantes qui nous étaient envoyées, au grand quartier général en Crimée, par un de nos collègues, médecin en chef de notre hôpital de Kamiesch. Cette coquille, perdue au milieu des petits crustacés, et à peu près de même couleur qu'eux, est brune en dessus, avec un liséré blanc à la suture; d'un brun-rosé en