

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda
Ordo	Neotaenioglossa
Familia	Obtortionidae
Subfamilia	-
Genus	Finella
Subgenus	-
specie	pupoides Adams A., 1860
subspecie	-

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	-
Descrizione	Conchiglia, come suggerisce il nome, pupoide, a spira elevata, costituita da 7 giri convessi. L'ornamentazione è data da strie assiali e spirali che formano un blando e non rilevato reticolo. La colorazione è bianca lucente con una fascia spirale a flammule marroncine, due sull'ultimo giro. La bocca è più piccola del diametro maggiore dell'ultimo giro.
Area di distribuzione	Specie lessepsiana. Il primo ritrovamento in Mediterraneo è del 1958, ad Haifa, Israele (Barash & Danin, 1977), poi Turchia (Engl, 1995) e Cipro (Buzzurro & Greppi, 1997), prima segnalazione per le coste italiane Otranto (LE) (Trono, in stampa).
Descrizione originale	-
Riferimenti bibliografici	BARASH A. & DANIN Z., 1977. Additions to the knowledge of Indo-Pacific Mollusca in the Mediterranean. <i>Conchiglie</i> , 13 (5-6): 85-116. ENGL W., 1995. Specie prevalentemente lessepsiane attestate lungo le coste turche. <i>Bollettino Malacologico</i> , Milano, 31 (1-4): 43-50. BUZZURRO & GREPPI, 1997. Note e considerazioni sui molluschi di Cipro con particolare riguardo alle specie alloctone. <i>La Conchiglia</i> , Roma, 29 (283): 21-31. TRONO D, in stampa. Contributo alla conoscenza dei molluschi conchiferi del Salento (Lecce, Italia)
Note	Scheda di Daniele Trono

Scheda fotografica:	
Foto	



f./var.
provenienza
misure
Note

-
Otranto (LE)
2,67 mm
Foto di Daniele Trono