Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda
Ordo	
Familia	Triphoridae
Subfamilia	Metaxinae
Genus	*Metaxia*
Subgenus	
specie	*metaxae* (Delle Chiaie, 1828)
subspecie	

Scheda descrittiva:	
Sinonimi	*Cerithium crosseanum* Tiberi, 1863 *Cerithium subcylindricum* Brusina, 1865 *Cerithium benoitianum* Monterosato, 1869 *Metaxia rugulosa* var. *exilissima* Monterosato, 1884 *Cerithiopsis metaxae* var. *alba* Marshall, 1893 *Cerithiopsis excavata* Locard, 1897
Descrizione	Secondo Bouchet (1985): Animale bianco latte, qualche volta leggermente giallastro, con piccole macchie biancastre granulose. Conchiglia adulta composta da tre spire larvali e da 10-15 spire della teleoconca. Protoconca bruna, ad eccezione della parte embrionale lievemente rosea; teleoconca bruna negli individui vivi, bruno chiara nelle conchiglie vuote, dove lo spazio intergranulare dei cordoni spirali è più scuro dei granuli. Periostraco molto spesso, spugnoso negli animali vivi. Teleoconca a spire convesse, ornate da 5 cordoni spirali. I cordoni da 1 a 4 compaiono immediatamente, il primo inizialmente più debole si sviluppa progressivamente […]. Questi cordoni sono attraversati dalle coste assiali e le loro intersezioni formano dei granuli […]. Il quinto cordone è liscio […]. Labbro esterno semplice. Canale sifonale largo e profondo.
Area di distribuzione	Tutto il Mediterraneo
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	BOUCHET P., 1984. Les Triphoridae de Mediterranee et du proche Atlantique (Mollusca, Gastropoda). *Lavori SIM*, **21**: 5-58. (Traduzione a cura di Alberto Lubiani)
Note	Scheda di Daniele Trono

Scheda fotografica:	
Foto	
f./var.	
provenienza	Spagna
misure	6mm
Note	Foto di Femorale (www.femorale.com.br)