

6. *Chemnitzia gracilis* Ph.

Tarentum pariter hanc speciem mihi obtulit.

7. *Chemnitzia pusilla* Ph. vide tab. XXVIII. f. 21.

Ch. testa minuta, turrita; anfractibus explanatis, altitudine dimidiam latitudinem vix superantibus, sutura profunda divisis; costis (circa 16) obliquis, interstitia aequantibus.

Tarenti specimen 4 repperi.

Testa $1\frac{1}{4}$ " alta, $\frac{7}{12}$ " lata, forma turrita, apicem versus subito acuminata ad Ch obliquatam accedit, anfractibusque novem constat. Differt ab hac: anfractibus explanatis; a Ch. elegantissima, rufa etc. forma et magnitudine; a Ch. densescostata numero costarum magnitudine etc. Utrum striae adsint bene videri non potest propter testam aliquantulum incrassatam, duas saltem transversas, suturam in anfractum ultimum continuantes, distinguo.

8. *Chemnitzia Humboldti* Riss.

Ischia.

p. 141. adde Naticis fossilibus:

9. *Natica subcarinata* Walk.

Carrubbare prope Rhegium.

p. 142. nr. 3. *Janthina patula* Ph. vide tab. XXVIII. f. 14.

J. testa ovata; spira deppressa, obtusissima; anfractibus omnibus valde rotundatis, sutura canaliculata divisis; apertura patula; columella concava; angulo labri cum columella obtuso, rotundato.

Prope Neapolin detexit, mihiique misit cl. Scachi.

Specimen maximum 11" altum, 13" latum; apertura 11" alta, $8\frac{2}{3}$ " lata. Color pallidissimus, e violaceo-albidus, columella modo et pars ultima labrum cingens obscuriora. Forma sua satis bene cum J. prolongata Blainville Dict. Sc. nat. vol. 2. malac. tab. XXXVII. bis. f. 1., quam tab. IX. fig. 16. transscripsi, sive J. globosa Swains. convenit, sed suturis canaliculatis, et apertura patula satis superque differre videtur.

p. 146. adde post Delphinulam laevem:

2. *Delphinula exilissima* Ph. vide tab. XXVIII. f. 2.

D. testa minima, orbiculata, valde deppressa, supra fere plana; anfractibus 4 teretibus, ultimo lineis transversis elevatis 5 cincto, umbilico maximo.

In arena Peninsulae Thapsi specimen duo legi.

Testa modo diametrum $\frac{1}{2}$ " habet, alba, nitida est, et carinis suis transversis acutiusculis statim cognoscitur. Alterum specimen laeve est, alterum lineis incrementis distantibus fere crispatum.

p. 148. ante Solarium:

MARAVIGNIA Ar. et Mag.

„Testa solida, ovato-conica; spira acuta; anfractibus rotundatis, transverse sulcatis, ultimo maximo, reliquam spiram duplo superante, perforata. Apertura ovalis, marginibus superne disjunctis, labro columellari simplici acuto, partim reflexo et umbilicum obtegente; labro dextro undato, acuto, oblique truncato, vix reflexo, satis porrecto, extremitate labio columellari adjuncta.“

Species unica.

Maravignia sicula 3" alta, $2\frac{1}{3}$ " lata, in argilla ad Aci Castello lecta. Descriptionem cl. Aradas et Maggiore verbotenus ex: Sunto di quattro Memorie malacologiche etc. (nescio