

## Cancellaria (*Cancellaria*) *cancellata* (Linné, 1767)

<b>Scheda tassonomica:</b>	
<b>Classis</b>	Gastropoda Cuvier, 1797
<b>Ordo</b>	Neogastropoda Thiele, 1929
<b>Superfamilia</b>	Cancellarioidea Forbes, E. & S. Hanley, 1851
<b>Familia</b>	Cancellariidae Forbes, E. & S. Hanley, 1851
<b>Subfamilia</b>	Cancellariinae Forbes, E. & S. Hanley, 1851
<b>Genus</b>	<i>Cancellaria</i> Costa, 1778
<b>Subgenus</b>	<i>Cancellaria</i> s.str.
<b>specie</b>	<i>cancellata</i> (Linné, 1767) [Voluta]
<b>subspecie</b>	

<b>Scheda descrittiva:</b>	
<b>Sinonimi</b>	? Buccinum pyrozonias - Gmelin, 1791 ? Cantharus triplicatus - Röding, 1798 ? Buccinella rotundata - Perry, 1811 ? Cancellaria costata - Sowerby G.B. I, 1822 = Cancellaria cancellata var. minor - Almera & Bofill, 1884 = Cancellaria cancellata var. infracosticillata - Sacco, 1894 = Cancellaria cancellata var. elongata - Kobelt, 1904 = Purpura bivert - Pallary 1920 -: ex Adanson (in sinonimia, nome non disponibile)
<b>Descrizione</b>	<p>Ha taglia media, abbastanza spessa e robusta. Ha spira conica poco elevata, con forma globosa, con gli anfratti rigonfi e sutura impressa.</p> <p>Lo stoma è ampio. Il labbro esterno termina sottile e tagliente con al suo interno delle piccole pliche; ha il labbro columellare con un callo abbastanza spesso, provvisto di grosse pliche. La scultura particolare è data da costole spirali aguzze che vengono incontrate da altre costole assiali, determinando un reticolo a maglie rettangolari. La colorazione è crema con una banda decorrente marrone (due sull'ultimo anfratto). In questa specie è assente l'opercolo. L'animale ha il piede grosso ed estremamente lungo; il capo è distinto e porta un paio di tentacoli con alla base gli occhi; la proboscide, anteriormente sottile, è rigonfia posteriormente ed è rivestita da una membrana. All'interno della cavità palleale si trovano la branchia, l'osfradio e, nei maschi, il pene molto grande, localizzato dietro al tentacolo destro.</p> <p>La radula e rachioglossa differenziata, formata da un'unica serie di denti rachidiani lunghi e sottili.</p>
<b>Dimensioni</b>	22 – 50 mm
<b>Area di distribuzione e habitat</b>	Specie che viene reperita su fondali detritici e fangosi nei piani infralitorale e circalitorale, nella porvincia lusitanica, limitatamente alla zona occidentale e in quella senegalese.
<b>Descrizione originale</b>	
<b>Riferimenti bibliografici</b>	- Sabelli B., 1980 - <i>Conchiglie</i> – Arnoldo Mondadori Editore, Milano; - Ferrario – <i>Conchiglie</i> : 151
<b>Riferimenti on line</b>	<a href="http://www.gastropods.com/7/Shell_377.html">http://www.gastropods.com/7/Shell_377.html</a> <a href="http://shell.kwansei.ac.jp/~shell/pic_book/data51/r005033.html">http://shell.kwansei.ac.jp/~shell/pic_book/data51/r005033.html</a> <a href="http://www.somali.asso.fr/clemam/biotaxis.php">http://www.somali.asso.fr/clemam/biotaxis.php</a>
<b>Comparazione</b>	
<b>Note</b>	
<b>Redattore</b>	Scheda di Marco Sanniu, aggiornamento sinonimi Domenico Ramazzotti – aggiornata al 14/10/2006

Riferimenti fotografici		
		
Foto 1	Foto 2	