

Gibbula (*Gibbula*) *albida* (Gmelin, 1791)

Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Vetigastropoda Salvini-Plawen & Haszprunar, 1987
Superfamilia	Trochoidea Rafinesque, 1815
Familia	Trochidae Rafinesque, 1815
Subfamilia	Trochinae Rafinesque, 1815
Genus	<i>Gibbula</i> Risso, 1826 ex Leach ms.
Subgenus	<i>Gibbula</i> s.str.
specie	<i>albida</i> (Gmelin, 1791) [Trochus]
subspecie	
Scheda descrittiva:	
Sinonimi	= <i>Trochus magulus</i> Deshayes 1833 = <i>Trochus bornii</i> Contraire 1835 = <i>Trochus biasoletti</i> Philippi 1836 = <i>Trochus lyciacus</i> Forbes 1844 = <i>Trochus clodianus</i> Nardo 1847 = <i>Trocus albidus</i> var. <i>pontica</i> Milaschewitsch 1908 = <i>Gibbula purpurea</i> Coen 1930 = <i>Gibbula thiara</i> Coen 1930
Descrizione	Conchiglia con spira composta di giri quasi piani e appiattiti nella parte superiore, separati da una profonda sutura a volte canalicolata. La scultura è costituita da cordoncini spirali poco granulosi e da strie di accrescimento oblique, abbastanza visibili. Colorazione varia, spesso con flammule e punti più scuri. (D'Angelo & Gargiullo 1978).
Dimensioni	10-24 mm
Area di distribuzione e habitat	Comune nel Mediterraneo orientale, in poche aree delle coste catalane della Spagna e nell'alto Adriatico, dove vive su fondali sabbiosi poco profondi vicino a <i>Posidonia</i> . Presente anche nel Mar Nero (Poppe & Goto, 1991)
Descrizione originale	
Riferimenti bibliografici	<ul style="list-style-type: none"> - D'Angelo G. & Gargiullo S. – 1978 - Guida alle conchiglie Mediterranee. 224 pp. Fabbri Editori. - Poppe G. & Goto Y. – 1991 - European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). 352 pp. C. Hemmen, Germany.
Riferimenti on line	http://www.somali.asso.fr/clemam/biotaxis.php
Comparazione	Può essere confusa con <i>G. magus</i> , da cui si distingue facilmente per le dimensioni minori, la conchiglia lievemente più lucida e l'ombelico quasi sempre chiuso o molto stretto e coperto dal callo columellare (Poppe & Goto, 1991; D'Angelo & Gargiullo, 1978)
Note	La maggior parte delle conchiglie presenta un colore smorto, che varia dal bianco sporco al grigio fino al verde-oliva, tuttavia si possono trovare anche esemplari di colore rosso brillante o bluastro. Le dimensioni variano in base al biotopo. La scultura spirale può essere ben sviluppata o quasi assente. Numerosi Autori indicano con "forma <i>pontica</i> " i piccoli esemplari provenienti dal Mar Nero (Poppe & Goto 1991).
Redattore	Scheda di Silvia Alfinito – aggiornata al 14.10 2006

Riferimenti fotografici		
		
Foto 1	Foto 2	Foto 3
		
Foto 4		