

Pseudosimnia carnea (Poiret, 1789)

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Scheda tassonomica: | |
| Classis | Gastropoda Cuvier, 1797 |
| Ordo | Caenogastropoda Cox, 1959 |
| Superfamilia | Cypraeoidea Rafinesque, 1815 |
| Familia | Ovulidae Fleming, 1822 |
| Subfamilia | Ovulinae Fleming, 1822 |
| Genus | <i>Pseudosimnia</i> Schilder, 1927 |
| Subgenus | |
| specie | <i>carnea</i> (Poiret 1789) |
| subspecie | |

| | |
|--|--|
| Scheda descrittiva: | |
| Sinonimi | <p>= <i>Ovula dentata</i> Fischer von Waldheim, 1807 ! <i>Ovula triticea</i> Lamarck, 1810 Sensu Auct. = <i>Ovula cepula</i> Schumacher, 1817 = <i>Bulla lepida</i> Dillwyn, 1817 = <i>Bulla nucleus</i> Dillwyn, 1817 = ? <i>Pseudosimnia vauhyningi</i> Smith M., 1840 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>pallida</i> B.D.D., 1883 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>rubra</i> B.D.D., 1883 = <i>Ovulum rufulum</i> Mollerat, 1890 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>elongata</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>globosa</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>major</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>minor</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>obtusula</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>violacea</i> Pallary, 1900 = <i>Ovula carnea</i> var. <i>gibbosa</i> Pallary, 1900 = <i>Primovula carnea</i> var. <i>dosolirata</i> Coen, 1949</p> |
| Descrizione | <p><i>Pseudosimnia carnea</i> è la specie più comune fra i rappresentanti della famiglia Ovulidae. Diffusa in tutto il Mediterraneo vive sul Corallo rosso cibandosi dei suoi polipi.</p> <p>Conchiglia solida a forma di pera, ricorda una piccola <i>Cyprea</i> per la lucentezza e per l'apertura che occupa tutta la base del guscio. La conchiglia immatura si presenta fragile e con il labbro non ispessito, ma tagliente.</p> <p>La conchiglia adulta non raggiunge in genere i 20 mm e la colorazione sempre sfumata va dal rosso porpora al nocciola rosato; si può trovare anche qualche esemplare bianco crema.</p> |
| Dimensioni | In letteratura si parla come dimensione massima di 20 mm, ma in linea generale le più grandi si aggirano intorno ai 16mm . |
| Area di distribuzione e habitat | Tutto il Mediterraneo , su Corallo rosso |
| Descrizione originale | |
| Riferimenti bibliografici | <ul style="list-style-type: none"> - Parenzan P. – 1970 - Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo, Vol. 1 – Gasteropodi - Bios Taras Editore; - Poppe & Goto – 1991 - European Seashells, Vol. 1 - Verlag Christa Hemmen |
| Riferimenti on line | <p>http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9115 http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8996 http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8491</p> |
| Comparazione | |
| Note | |
| Redattore | Scheda di Maria Teresa Spanu – aggiornata al 15.10.2006 |

| Riferimenti fotografici | | |
|---|---|--|
|  |  | |
| Foto 1 | Foto 2 | |