

## **Helix Pantanellii.**

1876 **HELIX STRIGELLA** (non Drap.) Pantanelli: Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili del bacino del Maroggia. Bull. d. Soc. Malac. It. V. II, pag. 235.

*Testa umbilicata, tenuissima, fragilis, hyalina, parum fusca, prope suturas interdum albicans et in medio ultimi anfractus obscure albo-fasciata, convexiuscula, depressa: apex obtusus: anfractus 5 1/4, regulariter crescentes; primus nitidus, alii tenuissime et frequenter longitudinaliter strigilati, transverse obsolete malleati, sutura distincta sed non profunda divisi; anfractus ultimus valde maior, superne fere planulatus, inde rotundatus, convexiusculus, prope ab ore vix lente ascendens; umbilicus parvus, amplius (0" 8), valde profundus; os ovatum, parum de-*

*pressum; margo columellaris vel amine albido tenuissimo marginis oris coniungenti tectus; peristoma simplex, acutum, cornuum, intus prope ab ore callo tenui albido vel brunneo incrassatum.*

*Differt ab H. CANTIANA Mtg., testa minus solida, fragili, scandicante; spira magis deppressa, tenuissima strigilata; ore minus rotundato; umbilico profundiore.*

Diam. 15"              Alt. 8", 2

• Molto abbondante sulla cima del Fioughi al Sud di Spoleto a circa mille metri sul livello del mare; mai raccolta nelle parti più basse • (Pantanelli).

È ben diversa dall'*H. strigella* la quale non si trova se non nell'Italia settentrionale, nè occorre che dica per quali caratteri, bastando notare come essa si accosti invece all'*H. cantiana* Mtg., della quale si può considerare come una varietà estrema. È però diversa da questa pella fragilità e trasparenza, per la mancanza di colorazione rossastra, per la depressione della spira, pell'apertura meno rotonda, e per l'ombelico stretto ma molto profondo. Ha pure qualche analogia coll'*H. Archimedea* Benoit, della Sicilia.